

หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ยา DRV

1 ต้องไม่เป็นผู้ป่วยระยะสุดท้าย (terminally ill)

2 เป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

2.1 เป็นกลุ่มผู้ที่ติดต่อยากลุ่ม PI ซึ่งต้องมีคุณสมบัติครบทุกข้อดังนี้

- กำลังรับประทานสูตรยาที่มี PI และคงที่อย่างน้อย 6 เดือน
- มีผลการตรวจปริมาณไวรัส (viral load) ที่ยืนยันว่ามีการรักษาล้มเหลว (viral load > 1,000 copies/ml)
- มีผลการตรวจการดื้อยา (genotype) ที่มีผลว่าดื้อยาทั้ง 3 กลุ่ม (NRTIs, NNRTIs, PIs) โดยมีผลดื้อต่อยากลุ่มละอย่างน้อย 1 ชนิด และดูจากผลตรวจการดื้อยาในอดีตทั้งหมดของผู้ติดเชื้อรายนั้น ๆ
- มีผลการตรวจการดื้อยา (genotype) ที่มีการดื้อยาในกลุ่ม PIs โดยมี major PI mutations อย่างน้อย 2 mutations [D30N, V32I, M46I, I47A, G48C, I50L, I50V, I54L, I54M, T74P, L76V, V82A, V82F, V82L, V82S, V82T, I84V, N88S, L90M]
- มีผลการตรวจการดื้อยาที่พบว่าเชื้อยังคงไวต่อยา DRV (no evidence of resistance)
- ยังคงมียาในกลุ่มอื่นอีกอย่างน้อย 1 ชนิดที่เชื้อยังไวอยู่ และสามารถใช้ร่วมกับ DRV ได้
- ไม่ได้กำลังใช้หรือจะใช้ยาที่ห้ามใช้ร่วมกับ DRV

2.2 กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่จำเป็นต้องใช้ยาในกลุ่ม PIs แต่มีอาการแพ้ยา หรือ ไม่สามารถทนต่อผลข้างเคียงของทั้งยา LPV/r และยา ATV/r ได้

3 มีความน่าเชื่อถือพอว่าผู้ติดเชื้อจะสามารถรับประทานสูตรยาที่มี DRV ได้อย่างสม่ำเสมอและมีผลการประเมิน adherence ร้อยละ 95-100