



ที่ สธ 5100/316

องค์การเภสัชกรรม

75/1 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กทม. 10400

8 มีนาคม 2554

เรื่อง ขอชี้แจงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์วัคซีน เจ อี ขนาด 1 มล. สายพันธุ์ Nakayama (2 paediatric doses)  
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ตามที่วัคซีน เจ อี ขนาด 0.5 มล. (2 paediatric doses) สายพันธุ์ Beijing ที่กระจายในระบบ VMI วัคซีน EPI-Routine ได้มีการขาดคราวในช่วงที่ผ่านมาแล้วนั้น เพื่อให้การสนับสนุนวัคซีนในระบบเป็นไปอย่างต่อเนื่อง องค์การเภสัชกรรมจึงได้จัดหาวัคซีน เจ อี ขนาด 1 มล. สายพันธุ์ Nakayama (2 paediatric doses) สำหรับกระจายให้ในระบบทดแทน ซึ่งองค์การเภสัชกรรมขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดังนี้

1. วัคซีน เจ อี ขนาด 1 มล. (2 paediatric doses) เป็น **วัคซีนสายพันธุ์ Nakayama**
2. ขนาดการใช้วัคซีน แตกต่างจากวัคซีนสายพันธุ์ Beijing โดยใช้ตามรายละเอียดดังนี้
  - 2.1 เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ใช้ขนาด 0.5 มล.
  - 2.2 เด็กที่อายุมากกว่า 3 ปีและผู้ใหญ่ให้ใช้ในขนาด 1 มล.
3. โปรดตรวจสอบข้อมูลการใช้วัคซีน และศึกษาเอกสารกำกับการใช้วัคซีนก่อนใช้ ซึ่งสามารถ download ได้จากเว็บไซต์ขององค์การเภสัชกรรม <http://scm.gpo.or.th/vmi> ภายใต้หัวข้อ วัคซีน EPI-Routine

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณที่ได้ให้การสนับสนุนองค์การเภสัชกรรมด้วยดี  
ตลอดมา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิฑิต อรรถเวชกุล)

ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม

ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์

แผนกบริหารการสั่งซื้อ 3

โทร. 0-2203-8927

โทรสาร 0-2354-8854