

ที่ สธ 5100/พิเศษ



องค์การเภสัชกรรม
75/1 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กทม. 10400

10 กุมภาพันธ์ 2554

เรื่อง ขอชี้แจงเกี่ยวกับการจ่ายวัคซีน เจ อี ขนาด 5 มล.

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ตามที่วัคซีน เจ อี ขนาด 0.5 มล. (2 paediatric dose) ที่กระจายในระบบ VMI วัคซีน EPI-Routine ได้มีการขาดคราวในช่วงที่ผ่านมาแล้วนั้น เพื่อให้การสนับสนุนวัคซีนในระบบเป็นไปอย่างต่อเนื่อง องค์การเภสัชกรรมจึงได้ดำเนินการกระจายวัคซีน เจ อี ขนาด 5 มล. (20 paediatric dose) เพื่อทดแทน ซึ่ง องค์การเภสัชกรรมขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดังนี้

1 วัคซีน เจ อี ขนาด 5 มล. (20 paediatric dose) เป็นวัคซีนสายพันธุ์ Beijing ซึ่งเป็นชนิดเดียวกันกับวัคซีนที่เคยนำส่งให้ในระบบ

2. ขนาดการใช้วัคซีน ใช้ตามรายละเอียดดังนี้ เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ใช้ขนาด 0.25 มล. ส่วนเด็กที่อายุมากกว่า 3 ปีและผู้ใหญ่ให้ใช้ในขนาด 0.50 มล.

3. วัคซีนเมื่อใช้แล้ว ควรใช้ยาที่เหลือภายใน 24 ชั่วโมง

4. โปรดตรวจสอบฉลากวัคซีน และศึกษาเอกสารกำกับการใช้วัคซีนก่อนใช้ ซึ่งสามารถ download ได้จากเว็บไซต์ ขององค์การเภสัชกรรม <http://scm.epo.or.th/vmi> ภายใต้หัวข้อ วัคซีน EPI-Routine

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณที่ได้ให้การสนับสนุนองค์การเภสัชกรรมด้วยดี
ตลอดมา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิฑิต อรรถเวชกุล)
ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม

องค์การเภสัชกรรม
โทร. 0-2203-8927
โทรสาร 0-2354-8854