

# J.E. (Beijing) - GPO

## JAPANESE ENCEPHALITIS VACCINE

### วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบ เจอี สายพันธุ์เบจิ้ง องค์การเภสัชกรรม

#### คุณลักษณะ

วัคซีนใช้ส่วนของอักเสบ เจอี ชนิดเดือดอย่างเป็นวัคซีนใส่ในมิสติ มีตระกอนขนาดเฉลี่ยของเชื้อไวรัสที่เก็บขึ้น เครื่องให้จากการฉีดไวรัสสายพันธุ์ Beijing-I ในสมองของหนูตัวตัว ทำภารณฑ์ที่ไวรัสตัวที่รวมกัน ผู้ผลิตผ่านกระบวนการที่ให้ได้ เช่นด้านและบริษัทที่นำไปเตรียมเป็นวัคซีน หัวใจการปรับปรุงไวรัสของ Virus antigen เพื่อกับหรือมากกว่าวัคซีนมาตรฐาน ขององค์การเพื่อความปลอดภัย สำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ที่ต้องการได้รับวัคซีน

ชั่วโมงก่อน

วัคซีน 1 มล. ประตอนหัวชี้

Inactivated JE Virus	$\geq$ Antigen content of reference vaccine
Gelatin	0.02%
Tween 80	0.0003%
Thimerosal	0.009%
M 199 (without phenol red) qs	1 ml

ชีวิตประจำวัน

ใช้สำหรับการฉีดป้องกันไวรัสไข้สมองอักเสบจากเชื้อไวรัสเจอี

#### วิธีการให้วัคซีน

1. การให้วัคซีนชั่วโมง ให้ครั้งละ 0.5 มล. โดยฉีดเข้าใต้ผิวหนัง 2 ครั้ง ห่างกัน 1-2 สปีชัฟต์ สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 6 ปี ให้ฉีดเข้าในใบเริมที่มีการระบายน้ำของใบเริมที่สูง ให้อัตราที่น้อย 1 ปี ห่างจาก 2 ปี หรือมากกว่า 1 ปี
2. การฉีดกระถุง ให้ฉีด 0.5 มล. ให้เข้าศีรษะทุกปี หรืออย่างน้อยที่สุดทุก 3 ปี ที่ห้องรับแขกบุรุษกันไป

หมายเหตุ ในเด็กที่อายุต่ำกว่า 3 ปี ให้ลดขนาดลงเหลือ 0.25 มล.

#### ต้องห้ามใช้

ห้ามใช้ในเด็กต่ำกว่า 6 ปี ยกเว้นในรายที่แพทย์อนุญาต

1. ผู้ป่วยที่มีไข้สูง หรือมีภาวะติดเชื้ออย่างรุนแรง
2. ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ ไข้ไข้ มะเร็งตับ
3. ผู้ป่วยไข้നາഭവ หรือไข้ไข้ขาดอาหาร
4. ผู้ที่มีประวัติการแพ้ ภายใน 1 ปี ก่อนหน้าให้วัคซีน
5. ผู้ที่ป่วยไข้คนละคนติดเชื้อไวรัส ลิมโฟมา และไข้คนละคนในระยะเพรอะแกรจาย
6. ผู้ป่วยที่เคยแพ้วัคซีนชนิดนี้
7. กรณีในระยะตั้งครรภ์

#### อาการแพ้แพ้

อาจเกิดอาการแพ้ที่ เช่น บวม แดง เบ่ง หรืออาการแพ้ไว เป็นต้น เป็นไข้ หนาวสั่น ปวดศีรษะ แต่หากว่ายานจะพบอาการเหล่านี้ได้ด้วยมาก

ขอควรระวังในการใช้

1. ไม่ใช้ยาที่มีวัคซีนเข็นจัดลงเป็นน้ำแข็ง
2. เข้าห้องคลอดน้ำที่ห้องต่อ
3. กระบอกและเข็มฉีดยาที่ใช้แล้วทิ้ง (Disposable) สำหรับแต่ละบุคคลที่อยู่ในห้องการฉีดเข้าไปในห้องน้ำที่ต่างๆ

ไว้เดิน

เก็บที่อุณหภูมิ 2-8°C (ห้ามเก็บในช่องแขวนแข็ง) และไม่ควรให้ถูกแสงแดด อาจก่อให้ยาเสื่อม หายใจหายใจ

หายใจหายใจ

วัคซีน 1 กล่อง บรรจุ 10 ขวด ขนาด 0.5 มล.

วัคซีน 1 กล่อง บรรจุ 10 ขวด ขนาด 5.0 มล. (multiple dose)

องค์การเภสัชกรรม ถนนพระราม 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร,