

แนวทางการดำเนินการ กรณีนำวัคซีนโปลิโอ ชนิดฉีด (IPV) แชนซ์

1. เมื่อโรงพยาบาลพบเหตุนำวัคซีน IPV แชนซ์ให้นำวัคซีนออกจากช่องแช่แข็งทันที และนำวัคซีนเก็บในตู้เย็น อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ก่อน
2. ให้โรงพยาบาล โทรฯแจ้งสำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค (02-5903222, 02-5903164, 02-5903165) เพื่อตรวจสอบข้อมูลทางวิชาการและเบิกวัคซีนชนิดเซเวนต์วันเพื่อให้ทันกำหนดการให้วัคซีน
3. ให้โรงพยาบาล จัดทำรายงานแจ้งเหตุการณ์วัคซีนเสียหายจากการจัดเก็บ โดย
 - ให้ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นผู้ลงนาม
 - หนังสือเรียนผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขต, สำเนาเรียน นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัด
 - ส่งหนังสือถึง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขต และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
4. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขต ทำหนังสือแจ้ง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส่วนกลาง
5. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ทำหนังสือแจ้ง สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
6. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส่วนกลางขออนุมัติขดเซเวนต์วันที่สูญเสียดังกล่าวจากการจัดเก็บ
7. สำนักโรคติดต่อทั่วไป รวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินความเพียงพอของวัคซีน
8. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ สำนักโรคติดต่อทั่วไป ประสานงานเพื่อตรวจสอบข้อมูล และ จัดเตรียมวัคซีนให้เพียงพอต่อการให้บริการในภาพรวม