



สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

๑๒๐ หมู่ ๓ ชั้น ๒-๔ อาคารรวมหน่วยงานราชการ “ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๑๐

ที่ สปสช. ๑๘.๗/ว.๐๐๐๓

๒๐ มกราคม ๒๕๕๕

เรื่อง ปัญหาและแนวทางปฏิบัติกรณียาวัณโรค Rifinah 300 ขาดคลังชั่วคราว

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการใช้ยา Rifinah® 150 ทดแทนยา Rifinah® 300 สำหรับผู้ป่วยวัณโรค

เนื่องด้วยกองทุนเพื่อบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ป่วยวัณโรค ได้รับแจ้งจากองค์การเภสัชกรรมว่า โรงงานผลิตยาเอกชนซึ่งผลิตยาวัณโรค Rifinah 300 (Rifampicin 300 + INH 150) ป้อนเข้าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งที่ผ่านมา ไม่สามารถส่งมอบยาให้กับองค์การเภสัชกรรมได้ตามกำหนดเวลา ส่งผลให้หน่วยบริการอาจประสบปัญหาการเบิกยา Rifinah 300 จากองค์การเภสัชกรรมเป็นการชั่วคราว

ในการนี้กองทุนเพื่อบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ป่วยวัณโรคขอแจ้งแนวทางปฏิบัติสำหรับหน่วยบริการกรณียา Rifinah 300 ขาดคลัง โดยพิจารณาใช้ยา Rifinah 150 (Rifampicin 150 + INH 100) ทดแทนหรือปรับเปลี่ยนเป็นยาแยกเม็ด (Loose pack) เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะสามารถเบิกยา Rifinah 300 ได้ตามปกติ ซึ่งจะแจ้งเวียนให้หน่วยบริการทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดแจ้งหน่วยบริการต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายแพทย์สรกิจ ภาศิณีพิพ)

ผู้จัดการอาวุโสกองทุนเพื่อบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ป่วยวัณโรค

กองทุนเพื่อบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ป่วยวัณโรค

ผู้ประสานงาน : ภก.ยุทธพงษ์ เจริญสวัสดิ์

โทรศัพท์ ๐-๒๑๔๑-๔๑๙๙,๐๘ ๔๓๘๗ ๘๐๕๑

e-mail : yutthapong.c@nhso.go.th

แนวทางการใช้ยา Rifinah® 150 ทดแทนยา Rifinah® 300 สำหรับผู้ป่วยวัณโรค

=====

ในกรณีที่ยา Fixed Dosed Combination: Rifinah® 300 ขาดแคลน และผู้ผลิตยาไม่สามารถผลิตยาได้ เนื่องจากสภาวะอุทกภัย หน่วยบริการสามารถพิจารณาการใช้ยา FDC: Rifinah® 150 ทดแทน Rifinah® 300 สำหรับการรักษาผู้ป่วยวัณโรค ได้ตามความเหมาะสม

ตารางที่ 1 : แสดงปริมาณยา Fixed Dosed Combination : Rifinah® 300 และ 150

รายการ	ปริมาณ Rifampicin (mg)	ปริมาณ INH (mg)
Rifinah® 300	300	150
Rifinah® 150	150	100

การใช้ยา Rifinah® 150 ทดแทนยา Rifinah® 300 สำหรับการรักษาผู้ป่วยวัณโรคนั้น หน่วยบริการต้องพิจารณาการให้ยา Rifinah® 150 ตามปริมาณ และน้ำหนักตัวของผู้ป่วยตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการรักษาผู้ป่วยวัณโรค โดยให้หน่วยบริการพิจารณาการใช้ยา Rifinah® 150 ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 2 : แสดงปริมาณการใช้ยา Rifinah® 150 จำแนกตามน้ำหนักตัว และการพิจารณาใช้ยาแยกเม็ดเพิ่มเติม

น้ำหนัก (กก.)	FDC : Rifinah® 150 (R150,H100)	การพิจารณาใช้ยาแยกเม็ดเพิ่มเติม
≤40	2 เม็ด	1) กรณีที่ผู้ป่วยมีน้ำหนักตัวใกล้เคียง 40 กก. ควรให้ยา INH ½ - 1 เม็ด เพิ่มกับผู้ป่วย 2) กรณีที่ผู้ป่วยมีน้ำหนักตัวต่ำกว่า 40 กก. มาก เช่น นน. 30 กก. ไม่จำเป็นต้องให้ INH เพิ่มเติม
41-50	3 เม็ด	ไม่จำเป็นต้องพิจารณาให้ยาแยกเม็ดเพิ่มเติม
>50	พิจารณาใช้ยาแยกเม็ดแทน	พิจารณาใช้ยาแยกเม็ดแทน

=====

(Handwritten mark)